

D. O. M.

POSITIONES ANATOMICÆ
ET
CHIRURGICÆ.



EX ANATOMIA.

I.



MIRANDAM Corporis humani ſtructuram ſolidis & fluidis mutuo gaudentibus motû conflari neminem latet. His omnibus integris, firmiſſima ac intacta viget ſanitas; aſt mutato naturali ipſorum æquilibrio, plurima enaſci incommoda quis non noverit!

I I.

INNUMERIS præſertim ſanguineis conſtituuntur canalibus & tubis ſolida ; alii à ſiniſtro Cordis Ventriculo ad omnes corporis partes, & Arterias : alii verò ex omnibus Corporis partibus ad dextrum Cordis Ventriculum procedunt, & Venas nuncupârunt Anatomici. De Venis hìc præcipuè hæmorrhoïdalibus ob tumores in ipſarum-met cavitate præter naturali dilatatione efformatos, acturi, quidquid ad ipſarum ſtructuram, diſtributiones, actionem & motum ſpectat, quantùm in nobis erit, exponere conabimur.

I I I.

EXTREMITAS Inteſtini recti inferior in foramen, Anum nuncupatum, deſinit : iſte pluribus firmatur Muſculis, quorum alii levatores, alii ſphincteres, craſſioribus prætereà exſtruitur membranis, variiſque irrigatur vaſis. Interna à Meſaraïcis, & externa ab Hypogaſtricis ſuppeditantur,eaque ſibi mutuò inoculantur.

I V.

QUO debilior cujuſcumque partis ſtructura, eo lentior in ipſius vaſis liquidorum circulatio ; haud ergò mirum accidit, quòd in venis Ano vicinis, hùc & illùc flaccido textû cellulari, maximâque pinguedinis copiâ circumdatis, multoties animadvertantur ingurgitationes.

EX CHIRURGIA.

I.

HÆMORRHOIS ſanguinis per quamlibet corporis partem, ſi vim nominis ſpectes, profluvium ſignificat. Veteres tamen fluores ſanguinis per venas duntaxat hæmorrhoïdeas hâc voce indigitârunt. Nos verò ut clariùs elucefcant quæ circa poſitiones ſunt indaganda, Hæmorrhoïdum nomine tumorem à venarum hæmorrhoïdalium tunicis in uno vel multiplici puncto ultra modum dilatatis efformatum intelligimus.

I I.

HÆMORRHOÏDUM differentiæ plures : Cœcæ nimirùm ſunt & apertæ. Cœcæ dicuntur quæ intùs latentes videri non poſſunt, quæque nullum prorsùs emittunt ſanguinem. Apertas è converſo deſignârunt, aut in quibus, quamquàm oculis ſint imperviæ, modò continuum, modò periodicum ſit ſanguinis profluvium, aut quæ viſui conſpicuæ, extrà tument. Illæ inflammatione afficiuntur, illæ ſecùs : magnitudine inſuper, numero, duritie inter ſe differunt : diſcrepant & figurâ : aliæ quippè morales à mori effigie, aliæ veſicales, ſeu uvales : loco prætereà, quòd nempè intùs vel extùs ſedeant.

I I I.

IMPEDITO in venis Hæmorrhoïdalibus, vel in vicinis, quoquo id fiat modo, ſanguinis circuitû, naſcuntur Hæmorrhoïdes. Plurimæ autem ipſis aſſignari poſſunt cauſæ ; aliæ enim internæ, aliæ verò externæ. Priores ex vitiatâ tùm ſolidorum, tùm fluidorum indole, & ex quâcumque compreſſione internâ liberum ſanguinis aſcenſum impediente, externæ cauſæ pariter ex compreſſione, contuſione, eroſione, nixû vehementiori &c. deducendæ ſunt.

I V.

EXTERNÆ tumore, ut plurimùm, rotundo, plùs minùs-ve molli, ſubcæruleo nonnunquàm colore, lentiori progreſſû creſcente, preſſione digiti ſæpè ſæpiùs evaneſcente dignoſcuntur Hæmorrhoïdes ; internæ verò difficiliori negotio & propriis tantùm accidentibus, doloribus ſcilicet acutiſſimis, in obeundis functionibus difficultate, ſanguinis profluvio, tenſione, calore, febri &c.

V.

FLUENTES moderatè Hæmorrhoïdes, quàm plurimos ſæpiſſimè curant morbos, imminentes arcent, integramque fovent ſanitatem : Quæ verò immoderatè fluunt, vires debilitant, totiuſque machinæ detrimentum inducunt.

V I.

CÆTERÙM à multiplicitate, ſede, naturâ, mole, accidentibus diverſa Hæmorrhoïdum deducenda prognoſis.

V I I.

Hæmorrhoïdum quæ internis in venis contingunt, palliativam tantùm seu à generalioribus remediis, seu à moderatâ victûs ratione expectandam censemus curationem, quæ quidem sæpissimè eradicalis efficitur. Exterioribus verò Hæmorrhoïdibus perfecta, ut plurimùm, competit curatio, imprimìs tumoris compressione, aut ligaturâ, si possibilis, hirudinum, medicamentorumque adstringentium usû, incisionibus & caustticorum interdùm appositione obtinenda.

V I I I.

Quinque demùm remediorum generibus ad quinque curationis scopos collimando, curantur Hæmorrhoïdes. Aperiendæ scilicet ultra modum tumentes, compescendus fluxus apertarum immodicus, præcavenda fœculenti sanguinis generatio, mitigandus dolor, ac tandem tollenda, si adsit, inflammatio.

Has positiones, Deo juvante *& Præside* M. FRANCISCO-MICHAELE DISDIER, *Artium & Chirurgiæ Magistro, tueri conabitur* Joannes-Baptista Dupuid, *Noviodunensis, Artium Liberalium Magister.*

PARISIIS,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Martis 17ª *Octobris, à sesqui-secundâ post meridiem ad Septimam. Anno Domini* 1752.

PRO ACTU PUBLICO,

ET

MAGISTERII LAUREA.

Typis Delaguette Regii Chirurg. Collegii Typographi. 1752.